Lue 1e fois
Lue 2e fois

Observation de Chirurgie sur un trépan.

Le neuf d'Avril 1744. je fus mandé, pour voir rüe de Tournon, à l'hotel de Montmoranci, une petite fille âgée de quatre ans et demi, laquelle joüant devant sa porte, pendant que des Couvreurs reparoient le toit de cet hôtel, reçut plusieurs tuiles sur la teste. Cet Enfant perdit connoissance sur le champ, et vomit beaucoup, ainsi qu'il me fut dit par celui qui vint me chercher.

Je m'y transportai aussitost avec Mr. Levret mon Confrére, qui étoit alors chez moy. Nous trouvames la malade sur son lit, dans un commencement d'affection comateuse, le visage bouffi, le poulx petit et concentré.

La premiére chose qui se présenta à notre vüe, ce fut une tumeur molle, de la grosseur d'un œuf de poule, et située à la partie supérieure, latérale, gauche du Coronal, au sommet de laquelle il y avoit une petite ouverture, semblable à celle d'une saignée: On y sentoit par le tact une pulsation considérable, qui auroit pû faire penser qu'elle étoit formée par la présence de la Dure-Mére et du Cerveau, et qui cependant n'étoit autre chose que l'effet naturel d'une artériole du Pericrâne, lequel étoit separé du Corps de l'Os dans toute l'étendüe de la tumeur. L'Artére par cet accident étant devenüe plus libre#, on appercevoit plus sensiblement ses pulsations. Remarque qui pourra être utile aux jeunes Chirurgiens.

En appuyant les doigts sur cette tumeur, il étoit aisé de reconnoître qu'il y avoit fracture et embarrure, parceque l'on trouvoit une portion d'Os enfoncée, et que l'on sentoit

et trouvant un obstacle a la circulation, par la compression et l'engorgement des vaisseaux:

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

ARC 45 n° 112

l'épaisseur de l'os qui étoit resté sain. Toutes ces circonstances réunies ensemble, ne nous laissérent aucun doute qu'il n'y eût compression et même épanchement; Cequi me détermina dans le moment à faire une incision cruciale # à la faveur de laquelle je reconnus que nonseulement il y avoit embarrure, mais même que la fracture s'étendoit jusqu'à la partie antérieure, supérieure et moyenne du pariétal du même côté, dirigée obliquement du côté de la suture sagitale, à l'extrêmité de laquelle il y avoit une espece de fracture en forme d'étoile. ces fractures étoit faites de façon quil netoit pas possible d'y passer la pointe d'un curedent.

ayant auparavant rasé la teste.

Ayant mis a decouvert toute l'étenduë de la blessure, je coupai les angles de la playe, et je la pensai avec des lambeaux de linge et une Compresse molement appliquée et soûtenuë d'un bandage contentif, en attendant que j'eusse préparé cequi étoit necessaire pour trepaner la malade.

Ce fut sur les quatre heures du soir de ce même jour que j'y retournai avec Mess.rs Tartanson, De Lion et Levret. Ayant éxaminé de nouveau la maladie, et vû que l'assoupissement étoit devenu plus considérable, et qu'une sueur froide s'étoit emparée de tout le Corps, nous jugeames d'un commun accord qu'il etoit d'une necessité absoluë de faire le trépan incessamment.

Ce point décidé, je declarai aux parents et aux assistants le pressant danger òu se trouvoit l'Enfant et que pour lui sauver la vie, il n'y avoit pas d'autre ressource que celle que la Chirurgie lui offroit. Ils se rendirent à mes raisons, et nous nous mimes en devoir d'opérer.

J'appliquai la premiére couronne de trépan à la partie supérieure, laterale, gauche, au dessus de la piéce

enfoncée ; et comme elle ne me donnoit pas assez de liberté pour passer un élevatoire, afin de tenter de ~~retirer~~ relever cette pièce, j'appliquai une seconde couronne audessus et à côté de la premiere. A la faveur des deux, je reconnus l'impossibilité de relever cette enfonçure, parcequ'elle étoit faite par la separation de la lame interne, dont une portion pénétroit la substance du Cerveau. Alors je passai sous la pièce enfoncée une feuille de mirthe, et j'en mis une seconde en travers, qui servoit de point d'appui ; et pendant qu'un assistant soûtenoit la pièce, j'appliquai une troisieme couronne en partie sur l'Os sain et en partie sur l'Os enfoncé, laquelle me facilita le moyen de dégager la pointe d'Os, que j'ai dit avoir pénetré dans la substance du Cerveau. Il sortit par cette ouverture une Cuillerée de serosité sanguinolente, et une petite portion de la substances du Cerveau, que je coupai. L'Enfant qui jusqu'alors avoit été comme immobile, commença à se plaindre.

Quoique par cette troisiéme couronne j'eusse dégagé la piece, je ne pus cependant l'avoir, parcequ'elle tenoit par une portion de sa lame interne du côté opposé, et qu'il y avoit à sa partie inferieure une petite pièce d'Os enfoncée, qui piquoit la Dure-Mére. Je fus donc obligé d'appliquer une quatriéme couronne de ce côté là, et alors je détachai totalement la pièce. Je remarquai que le péricrane étoit Contus dans la circonference de la division, accident que je regardai comme avantageux, parceque dans la chute de l'escarre, et par la division que la pointe d'Os y avoit faite, il facilitoit l'issuë de la matiére épanchée, comme je l'ai remarqué plusieurs fois.

[library stamp]

Il ne me restoit que la fracture en étoile, que j'ai dit être placée à la partie supérieure de la fracture: y ayant observé des pièces branlantes, sans avoir pû les relever, j'appliquai sur cet endroit une cinquiéme couronne, qui acheva cette opération.

La playe fut pensée à l'ordinaire avec un Sindon et de la charpie brute, le tout maintenu par un bandage approprié. Cet appareil appliqué, la malade fut saignée du pied, et le lendemain le fut encore deux fois; après lequel tems, elle jouït de toute la Connoissance dont elle étoit capable.

Dans la suite des pensemens je trempois le Sindon dans l'essence de thérébentine chaude, et les plumaceaux dans l'eau de vie, méthode que j'ai continuée jusqu'à la fin de la Cure, et que j'ai cruë préférable aux digestifs ordinaires, attendu que ces derniers en relâchant trop les fibres, produisent des chairs fongueuses, et en trop grande quantité, surtout dans un jeune sujet, et qu'on est obligé de les reprimer, pour attendre les exfoliations. Elles ne commencérent à se détacher que vers le quarantiéme jour. J'ai remarqué de plus que les pièces exfoliées ont conservé leur blancheur, ainsi que le prouvent celles que je présente.

J'eus soin à chaque pensement d'appliquer pardessus les plumaceaux, une suffisante quantité de charpie brute, maintenuë par une bandelette, laquelle charpie en se moulant sur la partie, s'opposoit à l'impulsion de la Dure-Mére et du Cerveau, et prévenoit la hernie par ce moyen, sans empêcher l'issuë des sérositez.

Je ne dois point omettre que dans le tems de la supuration la malade fut attaquée de fiévre: Ayant alors trouvé que

la playe supuroit peu, j'avois tout lieu de craindre un reflux de matiére purulente. J'attribuai cet accident à quelque complaisance de la part de la Mére sur le régime; mais cette femme m'ayant assûré qu'elle n'avoit rien à se reprocher, je soupçonnai quelque levain dans l'estomach, cequi m'engagea à saigner l'Enfant et à le purger le lendemain: Le purgatif lui fit rendre plusieurs vers et beaucoup de matiére bilieuse et verdâtre. Dans les vingt quatre heures la fiévre cessa et la supuration reprit son cours ordinaire.

La Cure a été terminée au bout de trois mois, et cet Enfant jouït actuellement d'une santé parfaite. Je lui ai fait faire une Calotte de Cuir bouilli, ~~audessous~~ sous laquelle on met une petite Compresse, tant pour s'opposer à l'impression de la Dure-Mere et du Cerveau, que pour donner le tems à la Cicatrice de se fortifier.

BIBLIOTHEQUE … MEDECINE

n.° 207.